



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 01
16/02/2023

PESCO **(GEMMA FERMA/ROTTURA GEMME)**

BOLLA

SIAMO IN GENERALE NELLA FASE DI RIPRESA VEGETATIVA PER CUI, NELLE VARIETÀ CHE SI PRESENTANO NELLA FASE DI ROTTURA GEMME ED IN PRESENZA DI CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ZIRAM(VARI)(MASSIMO 3 KG/HA, MAX UN INTERVENTO ALL'ANNO)

OPPURE

CAPTANO (VARI) , (MAX 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

DODINA (VARI) MAX 2 INTERVENTI/ANNO

SI RICORDA CHE I FORMULATI INDICATI HANNO EFFICACIA ANCHE CONTRO CORINEO

OPPURE

PRODOTTI RAMEICI (VARI) (SI RACCOMANDA DI RISPETTARE IL QUANTITATIVO COMPLESSIVO DI 4 KG DI RAME PER ETTARO ALL'ANNO) (EFFICACI ANCHE CONTRO **CANCRI RAMEALI)**

COCCINIGLIA

IN SITUAZIONI A RISCHIO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE ENTRO LA FASE DI GEMMA INGROSSATA CON PRODOTTI A BASE DI:

OLIO BIANCO (VARI)

OPPURE

OLIO MINERALE + ZOLFO (POLITHIOL)



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

ALBICOCCO-SUSINO-CILIEGIO (ROTTURA GEMME)

CANCRI RAMEALI-CORINEO

INTERVENIRE AL RIGONFIAMENTO DELLE GEMME IMPIEGANDO
PRODOTTI RAMEICI (VARI) (SI RACCOMANDA DI RISPETTARE IL
QUANTITATIVO COMPLESSIVO DI 4 KG DI RAME PER ETTARO ALL'ANNO)

MELO (GEMMA FERMA)

CANCRI RAMEALI

PREVEDERE DI ASPORTARE I RAMI COLPITI DA INFEZIONI DURANTE LA
POTATURA E SUCCESSIVAMENTE INTERVENIRE CON
PRODOTTI RAMEICI (VARI) (SI RACCOMANDA DI RISPETTARE IL
QUANTITATIVO COMPLESSIVO DI 4 KG DI RAME PER ETTARO ALL'ANNO)

COCCINIGLIA

IN SITUAZIONI A RISCHIO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE ENTRO LA FASE
DI GEMMA INGROSSATA CON PRODOTTI A BASE DI:

OLIO BIANCO + ZOLFO

OPPURE

OLIO BIANCO (VARI)

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO
FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE
ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei
prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando
della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello
con la migliore classificazione tossicologica.**