




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria





CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA


BOLLETTINO N° 04
06/04/2023

ANDAMENTO METEOROLOGICO







Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (CADUTA PETALI)

AFIDI

A FIORITURA ULTIMATA SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

SULFOXAFLOR (CLOSER)) IMPIEGABILE SU AFIDE VERDE **ENTRO IL 19 MAGGIO** AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO

OPPURE

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

SPIROTETRAMAT(MOVENTO)(MASSIMO DUE TRATTAMENTI)

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO SOLO SU AFIDE VERDE

MONILIA/OIDIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

TEBUCONAZOLO* (FOLICUR) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

DIFENOCONAZOLO* (SCORE 25 EC, ETC..) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

(SI RICORDA CHE I P.A IBE HANNO ANCHE AZIONE ANTIOIDICA: AL MASSIMO 4 TRATTAMENTI COMPLESSIVAMENTE)

OPPURE

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO UN INTERVENTO)

CYPRODINIL (CHORUS)**

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)**

(*MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO COMPLESSIVAMENTE TRA TEBUCONAZOLO E DIFENOCONAZOLO)

(**MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO COMPLESSIVAMENTE)



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

ALBICOCCO (ALLEGAGIONE)

CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

CAPTANO(VARI)(MAX 2 INTERVENTI ALL'ANNO)

TORTRICIDI

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE SULLE LARVE CHE ATTACCANO I FRUTTICINI CON PRODOTTI A BASE DI:

BACILLUS THURINGENSIS (VARI)

SUSINO (CADUTA PETALI)

AFIDI

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO

TENTREDINE

IN SITUAZIONI A RISCHIO PER PRESENZA DI DANNI NELLE PASSATE STAGIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE, CON PRODOTTI A BASE DI:

DELTAMETRINA (MASSIMO UN INTERVENTO)

MONILIA

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE IN CASO DI PIOGGIA O BAGNATURE PERSISTENTI CON

**DIFENOCONAZOLO (SCORE) o TEBUCONAZOLO (FOLICUR):
(COMPLESSIVAMENTE MASSIMO 2 INTERVENTI)**

OPPURE

**TRIFLOXYSTROBIN (FLINT MAX) o PYRACLOSTROBIN (MAX 2
INTERVENTI COMPLESSIVI) o BOSCALID (CANTUS) (MAX 2
INTERVENTI)**

**FLUDIOXINIL+CYPRODINIL (SWITCH) o CYPRODINIL (CHORUS)
(MASSIMO 1 INTERVENTO)**



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO (FIORITURA)

MONILIA

VISTE LA FASE FENOLOGICA E LE CONDIZIONI CLIMATICHE ATTUALI, NON SI CONSIGLIANO INTERVENTI SPECIFICI

MELO (FIORITURA)

A FIORITURA ULTIMATA ED IN PREVISIONE DI POSSIBILI PERTURBAZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)

OPPURE

FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)

FRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 14 INTERVENTI INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSAITÀ.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.