




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria






CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 06 03/05/2023

ANDAMENTO METEOROLOGICO







Coldiretti Alessandria




CIA Alessandria





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria




CIA Alessandria

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

Montemarzino



I DATI DEL MONITORAGGIO TRAMITE CONTROLLO VISIVO E TRAPPOLE A FEROMONI EVIDENZIANO PRESENZA DI LARVE E ADULTI ED I MODELLI PREVISIONALI INDICANO CHE SIAMO NELLA FASE INIZIALE DELLA I GENERAZIONE.

IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE RISCHIO SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:


CLOTRANILIPROLE (CORAGEN) T.C. 14 GG (MASSIMO 2 INT.)
(PRODOTTO ATTIVO ANCHE CONTRO ANARSIA)

AFIDI/OIDIO

QUALORA NON SIANO ANCORA STATI EFFETTUATI TRATTAMENTI SPECIFICI, FARE RIFERIMENTO AL BOLLETTINO PRECEDENTE



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria


ALBICOCCO (ACCRESIMENTO FRUTTI)

FARE RIFERIMENTO AI BOLLETTINI PRECEDENTI

SUSINO (ACCRESIMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

Montemarzino



I MODELLI PREVISIONALI INDICANO CHE SIAMO NELLA FASE INIZIALE DELLA I GENERAZIONE. IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI TRATTARE CON PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA A BASE DI: **CLOTRANILIPROLE (CORAGEN) T.C. 14 GG (MASSIMO 2 INT.)**

CILIEGIO (ACCRESIMENTO FRUTTI)

FARE RIFERIMENTO AI BOLLETTINI PRECEDENTI



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (ALLEGAGIONE)

TICCHIOLATURA

IN PREVISIONE DI POSSIBILI PERTURBAZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)

FRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 14 INTERVENTI INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ.

FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

PER INTERVENTI SUCCESSIVI ALLE PIOGGE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE ED AGGIUNGERE UN PRODOTTO RETROATTIVO A BASE DI:

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

(TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)

OIDIO

SULLE VARIETÀ SENSIBILI ED IN SITUAZIONI A MAGGIOR RISCHIO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ZOLFO (VARI)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (FINE FIORITURA)

AFIDI

IN CASO DI PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI (AFIDE LANIGERO/GRIGIO), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

SULFOXAFLORE (CLOSER) IMPIEGABILE ENTRO IL 19 MAGGIO AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

SPIROTETRAMAT (MOVENTO) AL MASSIMO UN INTERVENTI/ANNO

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.