



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria





CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA


BOLLETTINO N° 07 18/05/2023

ANDAMENTO METEOROLOGICO







Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

IL MODELLO PREVISIONALE INDICA LA CONCLUSIONE DEL VOLO, IL PROSEGUIMENTO DELL'OVIDEPOSIZIONE E DELLA NASCITA LARVALE .

IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE RISCHIO SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:


EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 14 GG

SPINETORAM (DELEGATE WDG) (MASSIMO UN INT./ANNO) T.C 7 GG

ETOFENPROX (TREBON-SWORD UP)(MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG

SPINOSAD (LASER) T.C. 7GG.

BACILLUS THURINGENSIS (VARI)



OIDIO

NEI FRUTTETI A RISCHIO DI INFEZIONE E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI ANTOIDICI SPECIFICI A BASE DI:

ZOLFO

BUPIRIMATE (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

AFIDI

INTERVENIRE AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 3% DI GERMOGLI OCCUPATI CON PRODOTTI A BASE DI:

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

SPIROTETRAMAT(MOVENTO)(MASSIMO DUE TRATTAMENTI)

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO SOLO SU AFIDE VERDE

CILIEGIO-ALBICOCCO (INVAIATURA-MATURAZIONE)

MONILIA

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)
(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

PRESTARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA

CILIEGIO (INVAIATURA)

MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

ETOFENPROX* (TREBON, SWORD UP) T.C. 7 GG.

FOSMET*(SPADA 200 EC) T.C. 14 GG.

ACETAMIPRID* (EPIK) T.C. 14 GG *EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA SPINOSAD* (SPINTOR FLY): TALE FORMULATO VA UTILIZZATO CON TRATTAMENTI LOCALIZZATI (ESCA) T.C.7 GG

SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITÀ.



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

SUSINO (ACCRESIMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

IL MODELLO PREVISIONALI INDICA CHE È TERMINATO IL VOLO E PROSEGUONO L'OVIDEPOSIZIONE E LA NASCITA LARVALE.

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI TRATTARE CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:


EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

SPINETORAM (DELEGATE WG) (UN INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

ACETAMIPRID (KESTREL) (DUE INT./ANNO) T.C. 15 GG.



PERO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

PSILLA

È STATA OSSERVATA LA PRESENZA DI ADULTI E UOVA BIANCHE: IN FASE PREVALENTE DI UOVA GIALLE È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ABAMECTINA (VERTIMEC): AL MASSIMO 2 INTERVENTI ENTRO FINE GIUGNO

SPIROTETRAMAT (MOVENTO 48 SC): AL MASSIMO 1 INTERVENTO CONTRO L'AVVERSITÀ



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

LE CONDIZIONI CLIMATICHE SONO MOLTO FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI: INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI **CAPTANO** (MERPAN 80 WDG ETC..)

FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)

FRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 14 INTERVENTI INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ.

FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

PER INTERVENTI SUCCESSIVI ALLE PIOGGE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE ED AGGIUNGERE UN PRODOTTO RETROATTIVO A BASE DI:

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

(DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)

AFIDI

IN CASO DI PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI (AFIDE LANIGERO/GRIGIO), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

SPIROTETRAMAT (MOVENTO) AL MASSIMO UN INTERVENTI/ANNO

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.