






Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria




CIA Alessandria

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

IL MODELLO PREVISIONALE SEGNA LA L'INIZIO DEL VOLO DELLA SECONDA GENERAZIONE, CONFERMATO ANCHE DALLE CATTURE: AL MOMENTO NON SI CONSIGLIANO INTERVENTI DI DIFESA E SI RIMANDA AL PROSSIMO BOLLETTINO



OIDIO

NEI FRUTTETI A RISCHIO DI INFEZIONE E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA L'ASPORTAZIONE DEI GETTI COLPTI E DI INTERVENIRE CON PRODOTTI ANTIIDICI SPECIFICI A BASE DI:

ZOLFO

BUPIRIMATE (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

AFIDI

INTERVENIRE AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 3% DI GERMOGLI OCCUPATI CON PRODOTTI A BASE DI:

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO T.C. 14 GG

SPIROTETRAMAT(MOVENTO)(MASSIMO DUE TRATTAMENTI)T.C. 21 GG

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO SOLO SU AFIDE VERDE T.C. 14 GG



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO-PESCO-ALBICOCCO (INVAIATURA-MATURAZIONE)

MONILIA

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C. 7 GG. (MASSIMO 2 INT./ANNO)
(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C. 3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION) T.C. 3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) T.C. 3 GG.

(MASSIMO 1 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

PRESTARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA

CILIEGIO (INVAIATURA)

MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN FASE DI INVAIATURA (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

ETOFENPROX* (TREBON, SWORD UP) T.C. 7 GG.

ACETAMIPRID* (EPIK) T.C. 14 GG *EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA*

SPINOSAD (SPINTOR FLY): TALE FORMULATO VA UTILIZZATO CON TRATTAMENTI LOCALIZZATI (ESCA) T.C. 7 GG

SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITA'.



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

SUSINO (ACCRESCIAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA


SECONDO IL MODELLO PREVISIONALE STA PROSEGUENDO LA NASCITA DELLE LARVE (I GENERAZIONE):

IN SITUAZIONI DI RITARDO VEGETATIVO, IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI E PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO INTERVENTI SPECIFICI, È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO(AFFIRM OPTI) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.

SPINETORAM (DELEGATE WG) (UN INT./ANNO) T.C. 7 GG.

ACETAMIPRID (KESTREL) (DUE INT./ANNO) T.C. 15 GG.



AFIDI

INTERVENIRE AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 3% DI GERMOGLI OCCUPATI CON PRODOTTI A BASE DI:

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO T.C. 14 GG

SPIROTETRAMAT(MOVENTO)(MASSIMO UN TRATTAMENTO SOLO SU AFIDE VERDE T.C. 21 GG

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI T.C. 35 GG



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

SI SEGNA LA FINE DELL'INFEZIONE PRIMARIA, IN PREVISIONE DI PIOGGE INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI

CAPTANO (MERPAN 80 WDG ETC..)

FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)EFFICACE ANCHE CONTRO ALTERNARIA

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)

FRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 14 INTERVENTI INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ.

FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

AFIDI

IN CASO DI PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI (AFIDE LANIGERO/GRIGIO), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

SPIROTETRAMAT (MOVENTO) AL MASSIMO UN INTERVENTI/ANNO

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.



Coldiretti Alessandria




CIA Alessandria

CARPOCAPSA

I DATI DEI MONITORAGGI CONFERMANO CHE STA INIZIANDO IL VOLO E LA FASE DI OVIDEPOSIZIONE: SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE AD INIZIO PROSSIMA SETTIMANA CON PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

CLOTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)



OIDIO

NEI FRUTTETI A RISCHIO DI INFEZIONE E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA L'ASPORTAZIONE DEI GETTI COLPTI E DI INTERVENIRE CON PRODOTTI ANTOIDICI SPECIFICI A BASE DI:

ZOLFO

BUPIRIMATE (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistono diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.