



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria






CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 09
08/06/2023

ANDAMENTO METEOROLOGICO







Coldiretti Alessandria

Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria




CIA Alessandria

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

PROSEGUE IL VOLO DELLA SECONDA GENERAZIONE, L'OVIDEPOSIZIONE E LA NASCITA DELLE PRIME LARVE: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE PROSSIMAMENTE CON PRODOTTI AD AZIONE OVO-
LARVICIDA A BASE DI:

CLOTRANILIPROLE (CORAGEN) T.C. 14 GG (MASSIMO 2 INT.)
(PRODOTTI ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)



OIDIO/AFIDI

VEDERE LE INDICAZIONI DEI BOLLETTINI PRECEDENTI



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO-PESCO-ALBICOCCO (INVAIATURA-MATURAZIONE)

MONILIA

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C. 7 GG. (MASSIMO 2 INT./ANNO)
(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C. 3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION) T.C. 3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) T.C. 3 GG.

(MASSIMO 1 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

PRESTARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA

CILIEGIO (INVAIATURA)

MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:


ETOFENPROX* (TREBON, SWORD UP) T.C. 7 GG.

ACETAMIPRID* (EPIK) T.C. 14 GG *EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA SPINOSAD* (SPINTOR FLY): TALE FORMULATO VA UTILIZZATO CON TRATTAMENTI LOCALIZZATI (ESCA) T.C. 7 GG

SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITA'.



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria




CIA Alessandria

SUSINO (ACCRESCIAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

SIAMO NELLA FASE INIZIALE DEL VOLO DELLA SECONDA GENERAZIONE:
SI CONSIGLIA DI ATTENDERE LE INDICAZIONI DEI PROSSIMI BOLLETTINI



AFIDI

VEDERE LE INDICAZIONI DEI BOLLETTINI PRECEDENTI



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

IN PREVISIONE DI PIOGGE INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI

CAPTANO (MERPAN 80 WDG ETC..)

FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)EFFICACE ANCHE CONTRO ALTERNARIA

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)

FRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 14 INTERVENTI INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ.

FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

AFIDI

VEDERE LE INDICAZIONI DEI PRECEDENTI BOLLETTINI




Coldiretti Alessandria



CARPOCAPSA

STA PROSEGUENDO IL VOLO, LA FASE DI OVIDEPOSIZIONE E SIAMO ALL'INIZIO DELLA FASE LARVALE: SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

CLOTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)



OIDIO

NEI FRUTTETI A RISCHIO DI INFEZIONE E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA L'ASPORTAZIONE DEI GETTI COLPITI E DI INTERVENIRE CON PRODOTTI ANTOIDICI SPECIFICI A BASE DI:

ZOLFO

BUPIRIMATE (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.