



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria





CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 10
14/06/2023

ANDAMENTO METEOROLOGICO







Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria




CIA Alessandria

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

IL MODELLO PREVISIONALE INDICA IL PROSEGUIMENTO DEL VOLO, DELL'OVIDEPOSIZIONE E DELLA NASCITA LARVALE (CIRCA 20%) .
SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE DALLA PROSSIMA SETTIMANA, CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 14 GG
SPINETORAM (DELEGATE WDG) (MASSIMO UN INT./ANNO) T.C 7 GG
ETOFENPROX (TREBON-SWORD UP)(MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG
SPINOSAD (LASER) (MASSIMO 3 INTERVENTI CON SPINOSINE)T.C. 7GG.
BACILLUS THURINGENSIS (VARI)



OIDIO/AFIDI

VEDERE LE INDICAZIONI DEI BOLLETTINI PRECEDENTI



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO-PESCO-ALBICOCCO (INVAIATURA-MATURAZIONE)

MONILIA

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)
(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)**

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

**TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

**MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION) T.C. 3 GG. (MASSIMO 2
INTERVENTI/ANNO)**

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) T.C. 3 GG.

(MASSIMO 1 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

PRESTARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA

CILIEGIO (MATURAZIONE)

MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

ETOFENPROX* (TREBON, SWORD UP) T.C. 7 GG.

**ACETAMIPRID* (EPIK) T.C. 14 GG *EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA*
**SPINOSAD (SPINTOR FLY): TALE FORMULATO VA UTILIZZATO CON
TRATTAMENTI LOCALIZZATI (ESCA) T.C.7 GG****

**SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA
CONTRO TALE AVVERSITÀ.**



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO (MATURAZIONE)

DROSOPHILA SUZUKII

PER INTERVENTI SPECIFICI, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:
EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM OPTI) (1 INT./ANNO) T.C. 7 GG
DELTAMETRINA (DECIS EVO ETC) T.C. 7 GG GG (CON PIRETROIDI MASSIMO 2 INT./ANNO)
SPINETORAM (DELEGATE WDG) T.C. 7 GG (MASSIMO 2 INT/ANNO)

SI RICORDA CHE È STATO CONCESSO L'UTILIZZO IN DEROGA TERRITORIALE AI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA DEL FORMULATO A BASE DI **CYANTRANILIPROLE (EXIREL 2023)** T.C. 7 GG, NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO RIPORTATE IN ETICHETTA


SUSINO (ACCRESIMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

PROSEGUE IL NUOVO VOLO, L'OVIDEPOSIZIONE E STA INIZIANDO LA NUOVA FASE LARVALE (5%)

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE DALL'INIZIO DELLA PROSSIMA SETTIMANA CON PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

CLOANTRANILIPROLE (CORAGEN) T.C. 14 GG (MASSIMO 2 INT.)





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE SONO FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI SECONDARIE: SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI

CAPTANO (MERPAN 80 WDG ETC..)

FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)EFFICACE ANCHE CONTRO ALTERNARIA

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)

FRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 14 INTERVENTI INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ.

FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

AFIDI

VEDERE LE INDICAZIONI DEI PRECEDENTI BOLLETTINI



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI) CARPOCAPSA

A CAUSA DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE, STA PROSEGUENDO A RILENTO IL VOLO E LA FASE LARVALE (CIRCA 10%) : SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE DALLA PROSSIMA SETTIMANA CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:


EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) 7 GG

OPPURE

SPINETORAM (DELEGATE WDG) (MASSIMO 1 INT./ANNO) T.C. 7GG

OPPURE

ACETAMIPRID (EPIK) (DUE INT./ANNO) T.C. 14 GG.



OIDIO

VEDI INDICAZIONI DEI BOLLETTINI PRECEDENTI

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.