




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria






CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 13
20/07/2023

ANDAMENTO METEOROLOGICO







Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (MATURAZIONE)

CYDIA MOLESTA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI OPPURE AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI 10 CATTURE/TRAPPOLA A SETTIMANA, INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 14 GG
SPINETORAM (DELEGATE WDG) (MASSIMO UN INT./ANNO) T.C 7 GG
ETOFENPROX (TREBON-SWORD UP)(MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG
SPINOSAD (LASER) (MASSIMO 3 INTERVENTI CON SPINOSINE)T.C. 7GG.
BACILLUS THURINGENSIS (VARI)

MONILIA

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)
(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)
FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION) T.C. 3 GG. (MASSIMO 2
INTERVENTI/ANNO)
PENTHIOPYRAD (FONTELIS) T.C. 3 GG.
(MASSIMO 1 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')
PRESTARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA

SUSINO (ACCRESIMENTO FRUTTI-INIZIO MATURAZIONE)

CYDIA FUNEBRANA


IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI OPPURE AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI 10 CATTURE/TRAPPOLA A SETTIMANA, INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV/ANNO) T.C. 7 GG.
SPINETORAM (DELEGATE WG) (UN INT./ANNO) T.C. 7 GG.
ACETAMIPRID (KESTREL) (DUE INT./ANNO) T.C. 15 GG.



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

PROSEGUIRE LA DIFESA SOLO NEI MELETI DOVE SONO PRESENTI I SINTOMI: IN PREVISIONE DI EVENTI PIOVOSI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI **DITIANON (DELAN)**
BICARBONATO DI POTASSIO/POLISOLFURO DI CALCIO
ZOLFO

CARPOCAPSA

STA INIZIANDO LA FASE LARVALE DELLA II GENERAZIONE: IN PRESENZA DI DANNI VISIBILI OPPURE AL SUPERAMENTO DI 2 CATTURE/TRAPPOLA A SETTIMANA, INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:


EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) 7 GG

OPPURE

SPINETORAM (DELEGATE WDG) (MASSIMO 1 INT./ANNO) T.C. 7GG


OPPURE

ACETAMIPRID (EPIK) (DUE INT./ANNO) T.C. 14 GG.





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

CAPNODIS TENEBRIONIS

E' STATA SEGNALATA AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE LA PRESENZA DEL COLEOTTERO CHE STA CAUSANDO PROBLEMI SOPRATTUTTO SU ALBICOCCO: CI SONO STATE FORNITE INDICAZIONI TECNICHE PREVENTIVE PER IL CONTENIMENTO.

IN CASO DI PRESENZA, CONTATTARE IL SERVIZIO TECNICO DI ZONA



N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.