



Confagricoltura
Alessandria



Coldiretti Alessandria






CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 14
11/08/2023

ANDAMENTO METEOROLOGICO







Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (MATURAZIONE)

CYDIA MOLESTA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, FACENDO ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA, INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 14 GG
SPINETORAM (DELEGATE WDG) (MASSIMO UN INT./ANNO) T.C 7 GG
ETOFENPROX (TREBON-SWORD UP)(MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG
SPINOSAD (LASER) (MASSIMO 3 INTERVENTI CON SPINOSINE)T.C. 7GG.
BACILLUS THURINGENSIS (VARI)

MONILIA

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)
(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)
FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION) T.C. 3 GG. (MASSIMO 2
INTERVENTI/ANNO)
PENTHIOPYRAD (FONTELIS) T.C. 3 GG.
(MASSIMO 1 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

PRESTARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA

SUSINO (MATURAZIONE)

CYDIA FUNEBRANA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, FACENDO ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA, INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:
CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV/ANNO) T.C. 7 GG.
SPINETORAM (DELEGATE WG) (UN INT./ANNO) T.C. 7 GG.
ACETAMIPRID (KESTREL) (DUE INT./ANNO) T.C. 15 GG.



Coldiretti Alessandria



MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

IN PRESENZA DI DANNI VISIBILI OPPURE AL SUPERAMENTO DI 2 CATTURE/TRAPPOLA A SETTIMANA, INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) 7 GG

OPPURE

SPINETORAM (DELEGATE WDG) (MASSIMO 1 INT./ANNO) T.C. 7GG

OPPURE

ACETAMIPRID (EPIK) (DUE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

MARCIUMI DA CONSERVAZIONE

PER LE VARIETÀ IN FASE DI MATURAZIONE (GRUPPO GALA), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

CAPTANO (TRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 14 TRATT./ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA') T.C.21G.G.

OPPURE

FLUDIOXONIL (GEOXE). (CON FLUDIOXONIL AL MASSIMO 2 TRATT./ANNO) T.C.3 G.G.


PYRIMETANIL (SCALA). (CON ANILINOPIRIMIDINE AL MASSIMO 4 TRATT./ANNO COMPLESSIVI) T.C. 7 G.G.

CONTRO L'AVVERSITÀ AL MASSIMO UN INT/ANNO (DUE INTERVENTI/ANNO PER LE CULTIVAR RACCOLTE DOPO IL 15 SETTEMBRE)

IN CASO DI INTERVENTI IN PRE-RACCOLTA, SI CONSIGLIA DI ATTENDERE PROSSIME INDICAZIONI.



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

CAPNODIS TENEBRIONIS

E' STATA SEGNALATA AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE LA PRESENZA DEL COLEOTTERO CHE STA CAUSANDO PROBLEMI SOPRATTUTTO SU ALBICOCCO: CI SONO STATE FORNITE INDICAZIONI TECNICHE PREVENTIVE PER IL CONTENIMENTO.

IN CASO DI PRESENZA, CONTATTARE IL SERVIZIO TECNICO DI ZONA



N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.