




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria





CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA


BOLLETTINO N° 01  
16/02/2024

### ANDAMENTO METEOROLOGICO







Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria



CIA Alessandria





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

LE TEMPERATURE ANOMALE CHE SI STANNO REGISTRANDO IN QUESTO PERIODO STANNO FAVORENDO IL RISVEGLIO VEGETATIVO, ANTICIPANDO QUINDI L'ATTENZIONE VERSO I PRINCIPALI PATOGENI DELLE PIANTE FRUTTIFERE.

## **PESCO (ROTTURA GEMME)**

---

### **BOLLA**

SIAMO IN GENERALE NELLA FASE DI RIPRESA VEGETATIVA AVANZATA PER CUI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**ZIRAM(VARI)(MASSIMO 3 KG/HA, MAX UN INTERVENTO ALL'ANNO)**

*OPPURE*

**CAPTANO (VARI) , (MAX 2 INTERVENTI/ANNO)**

*OPPURE*

**DODINA (VARI) MAX 2 INTERVENTI/ANNO**

SI RICORDA CHE I FORMULATI INDICATI HANNO EFFICACIA ANCHE CONTRO CORINEO

*OPPURE*

**PRODOTTI RAMEICI (VARI) (SI RACCOMANDA DI RISPETTARE IL QUANTITATIVO COMPLESSIVO DI 4 KG DI RAME PER ETTARO ALL'ANNO)  
(EFFICACI ANCHE CONTRO **CANCRI RAMEALI**)**

### **COCCINIGLIA**

IN SITUAZIONI A RISCHIO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE ENTRO LA FASE DI GEMMA INGROSSATA CON PRODOTTI A BASE DI:

**OLIO BIANCO (VARI)**

*OPPURE*

**OLIO MINERALE + ZOLFO (POLITHIOL)**

## **ALBICOCCO-SUSINO-CILIEGIO (ROTTURA GEMME)**

---

### **CANCRI RAMEALI-CORINEO**

INTERVENIRE AL RIGONFIAMENTO DELLE GEMME IMPIEGANDO  
**PRODOTTI RAMEICI (VARI) (SI RACCOMANDA DI RISPETTARE IL QUANTITATIVO COMPLESSIVO DI 4 KG DI RAME PER ETTARO ALL'ANNO)**



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## ALBICOCCO (PRE-FIORITURA)

---

### MONILIA

SOLAMENTE NELLE SITUAZIONI ANTICIPO VEGETATIVO, SI CONSIGLIA DI PREVEDERE UN TRATTAMENTO SPECIFICO A BASE DI:

**DIFENOCONAZOLO**

**TEBUCONAZOLO (FOLICUR):** (COMPLESSIVAMENTE CON IBE MASSIMO 3 INTERVENTI)

**CYPRODINIL (CHORUS)**

**FLUDIOXINIL+CYPRODINIL (SWITCH)** (MASSIMO 2 INTERVENTI CON CYPRODINIL)

## MELO (GEMMA FERMA)

---

### CANCRI RAMEALI

PREVEDERE DI ASPORTARE I RAMI COLPITI DA INFEZIONI DURANTE LA POTATURA E SUCCESSIVAMENTE INTERVENIRE CON **PRODOTTI RAMEICI (VARI)** (SI RACCOMANDA DI RISPETTARE IL QUANTITATIVO COMPLESSIVO DI 4 KG DI RAME PER ETTARO ALL'ANNO)

### COCCINIGLIA

IN SITUAZIONI A RISCHIO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE ENTRO LA FASE DI GEMMA INGROSSATA CON PRODOTTI A BASE DI:

**OLIO BIANCO + ZOLFO**

*OPPURE*

**OLIO BIANCO (VARI)**

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**