




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria






CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 02
06/03/2024

ANDAMENTO METEOROLOGICO







Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

LE FORTI CONDIZIONI DI UMIDITÀ CAUSATE DALLE PIOGGE REGISTRATE IN QUESTI ULTIMI 15 GIORNI (OLTRE 100 MM) E LE PREVISIONI DI ULTERIORI FENOMENI PIOVOSI STANNO CREANDO LE CONDIZIONI DI ELEVATO RISCHIO PER LA MONILIA DELLE DRUPACEE, SOPRATTUTTO SU ALBICOCCO E PER LE VARIETÀ PRECOCI DI PESCO, PROSSIME ALLA FIORITURA

PESCO (BOTTONI ROSA)

BOLLA

SIAMO IN GENERALE NELLA FASE DI RIPRESA VEGETATIVA AVANZATA PER CUI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ZIRAM(VARI)(MASSIMO 3 KG/HA, MAX UN INTERVENTO ALL'ANNO)

OPPURE

CAPTANO (VARI) , (MAX 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

DODINA (VARI) MAX 2 INTERVENTI/ANNO

AFIDI/AFIDE VERDE

NELLE ZONE A RISCHIO, PER ATTACCHI NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

TAU-FLUVALINATE (KLARTAN 20 EW, MAVRIK 20 EW, ETC..).

AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO

FLONICAMID (TEPPEKI)(MAX 1 INT/ANNO)

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO


COCCINIGLIA

IN SITUAZIONI A RISCHIO, INTERVENIRE CON:

PYRIPROXIFEN (JUVINAL GOLD ETC) (AL MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO)



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria




CIA Alessandria

PESCO (BOTTONI ROSA)

MONILIA

IL MODELLO PREVISIONALE SINTONIZZATO SULLA STAZIONE METEOROLOGICA DI LOC. VILLE INDICA, PER VARIETÀ PRECOCI E QUINDI PROSSIME ALLA FIORITURA, UN ALTO RISCHIO D'INFEZIONE, IN RELAZIONE ANCHE ALLE PREVISIONI DI PIOGGIA PER I PROSSIMI GIORNI.



SE POSSIBILE INTERVENIRE, SOPRATTUTTO SULLE VARIETÀ PRECOCI, ENTRO LA FASE DI FIORITURA CON PRODOTTI A BASE DI :

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH A 0,3 KG/HA)

OPPURE

CYPRODINIL (CHORUS)

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

TEBUCONAZOLO (FOLICUR)(AL MASSIMO DUE INTERVENTI)

(I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI TRE VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')



Coldiretti Alessandria



SUSINO (BOTTONI BIANCHI)

CORINEO

INTERVENIRE IMPIEGANDO PRODOTTI A BASE DI

ZIRAM(VARI)(MASSIMO 3 KG/HA, MAX UN INTERVENTO ALL'ANNO)

OPPURE

CAPTANO (VARI) , (MAX 2 INTERVENTI/ANNO COMPLESSIVAMENTE CON ZIRAM E CAPTANO)

AFIDE VERDE

NELLE ZONE A RISCHIO, PER ATTACCHI NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLONICAMID (TEPPEKI)(MAX 2 INT/ANNO)

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO

PIRIMICARB (PIRIMOR) AL MASSIMO 1 INTERVENTI/ANNO

ALBICOCCO (FIORITURA)

MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E LA FASE DI SENSIBILITÀ ELEVATA, SI CONSIGLIA DI PREVEDERE UN TRATTAMENTO SPECIFICO CON PRODOTTI A BASE DI: (DEROGA)

DIFENOCONAZOLO (DIFCOR)

TEBUCONAZOLO (FOLICUR): (COMPLESSIVAMENTE CON IBE MASSIMO 3 INTERVENTI)

CYPRODINIL (CHORUS)

FLUDIOXINIL+CYPRODINIL (SWITCH) (MASSIMO 2 INTERVENTI CON CYPRODINIL).

ATTENZIONE: AL FINE DI SALVAGUARDARE L'AZIONE PRONUBA DELLE API, È VIETATO L'IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI CHE IN ETICHETTA RISULTINO DANNOSI/TOSSICI PER LE API.



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (ROTTURA GEMME)

CANCRI RAMEALI

PREVEDERE DI ASPORTARE I RAMI COLPITI DA INFEZIONI DURANTE LA POTATURA E SUCCESSIVAMENTE INTERVENIRE CON **PRODOTTI RAMEICI** (VARI) (SI RACCOMANDA DI RISPETTARE IL QUANTITATIVO COMPLESSIVO DI 4 KG DI RAME PER ETTARO ALL'ANNO)

TICCHIOLATURA

NONOSTANTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI, LO SVILUPPO VEGETATIVO DELLE PIANTE NON È ANCORA TALE DA ESSERE RECETTIVO PER LE INFEZIONI PRIMARIE: DAL RAGGIUNGIMENTO DELLA FASE DI PUNTE VERDI INTERVENIRE IN PREVISIONE DI PIOGGIA CON

**SALI DI RAME
METIRAM.**

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.