



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria






CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

**BOLLETTINO N° 04**  
**04/04/2024**

### ANDAMENTO METEOROLOGICO







Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## PESCO (FINE FIORITURA)

---

### BOLLA

SI SEGNA LA PRESENZA DI INFEZIONI DIFFUSE: IN TALI SITUAZIONI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**ZIRAM(VARI)**(MASSIMO 3 KG/HA, MAX UN INTERVENTO ALL'ANNO)

*OPPURE*

**CAPTANO (VARI)** , (MAX 3 INTERVENTI/ANNO)

### MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI, SI CONSIGLIA INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI :

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH A 0,3 KG/HA)**

*OPPURE*

**CYPRODINIL (CHORUS)**

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

**\*TEBUCONAZOLO (FOLICUR)**

**\*DIFENOCONAZOLO (DIFCOR)**

(\*HANNO ANCHE AZIONE ANTI-OIDICA)

(AL MASSIMO DUE INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE TRA  
TEBUCONAZOLO E DIFENOCONAZOLO)

(I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI QUATTRO VOLTE  
ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

### AFIDI

A FIORITURA ULTIMATA SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A  
BASE DI:

**SULFOXAFLO (CLOSER)** ) IMPIEGABILE ENTRO IL 28 GIUGNO A  
SEGUITO DI DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PER EMERGENZA  
FITOSANITARIA (UN INTERVENTO/ANNO)

**ACETAMIPRID (EPIK)** AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

**SPIROTETRAMAT(MOVENTO)**(MASSIMO DUE TRATTAMENTI)

**FLONICAMID (TEPPEKI)** AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO SOLO SU  
AFIDE VERDE



Coldiretti Alessandria



## PESCO (FINE FIORITURA)

---

### OIDIO

SU VARIETÀ SENSIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**ZOLFO (VARI)**  
**BUPIRIMATE (NIMROD)**

## SUSINO (CADUTA PETALI)

---

### AFIDI

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:  
**ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO**  
OPPURE

**FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTO/ANNO**

### TENTREDINE

IN SITUAZIONI A RISCHIO PER PRESENZA DI DANNI NELLE PASSATE STAGIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE, CON PRODOTTI A BASE DI:

**DELTAMETRINA (MASSIMO UN INTERVENTO)**

### MONILIA

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE IN CASO DI PIOGGIA O BAGNATURE PERSISTENTI CON  
**DIFENOCONAZOLO (SCORE) o TEBUCONAZOLO (FOLICUR):**  
(COMPLESSIVAMENTE MASSIMO 2 INTERVENTI)

OPPURE

**TRIFLOXYSTROBIN (FLINT MAX) o PYRACLOSTROBIN (MAX 2 INTERVENTI COMPLESSIVI)**

**FLUDIOXINIL+CYPRODINIL (SWITCH) o CYPRODINIL (CHORUS)**  
(MASSIMO 1 INTERVENTO)



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (INIZIO FIORITURA)

---

### TICCHIOLATURA

IN PREVISIONE DI PIOGGE INTERVENIRE CON

**DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)**

FRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 14 INTERVENTI  
INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ.

OPPURE

**METIRAM**

***ATTENZIONE: AL FINE DI SALVAGUARDARE L'AZIONE PRONUBA DELLE API, È VIETATO L'IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI CHE IN ETICHETTA RISULTINO DANNOSI/TOSSICI PER LE API.***

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**