




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria





CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA


BOLLETTINO N° 07
15/05/2024

ANDAMENTO METEOROLOGICO






Coldiretti Alessandria




Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria




**16
MM**



**12
MM**



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria




CIA Alessandria

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

Montemarzino



IL CICLO BIOLOGICO DELL'INSETTO PROCEDE LENTAMENTE: LA FASE LARVALE È IN CRESCITA PER CUI, IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE RISCHIO, È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 14 GG
SPINETORAM (DELEGATE WDG) (MASSIMO UN INT./ANNO) T.C 7 GG
ETOFENPROX (TREBON-SWORD UP)(MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG
SPINOSAD (LASER) (MASSIMO 3 INTERVENTI CON SPINOSINE)T.C. 7GG.
BACILLUS THURINGENSIS (VARI)

OIDIO


NEI FRUTTETI A RISCHIO DI INFEZIONE E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI ANTOIDICI SPECIFICI A BASE DI:

ZOLFO

BUPIRIMATE (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria




CIA Alessandria

SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

Montemarzino



DA MODELLI PREVISIONALI PROSEGUE LA FASE LARVALE: IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE RISCHIO È POSSIBILE INTERVENIRE DALLA PROSSIMA SETTIMANA CON PRODOTTI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

SPINETORAM (DELEGATE WG) (UN INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

ACETAMIPRID (KESTREL) (DUE INT./ANNO) T.C. 15 GG.



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO (INVAIATURA)

MONILIA

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION) T.C.3 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)

**TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)
(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)**

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

**TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

PRESTARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA

CILIEGIO (INVAIATURA)

MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN FASE DI INVAIATURA (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

ETOFENPROX* (TREBON, SWORD UP) T.C. 3 GG.

ACETAMIPRID* (EPIK) T.C. 14 GG *EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA*

SPINOSAD (LASER) T.C.7 GG

SPINOSAD (SPINTOR FLY): TALE FORMULATO VA UTILIZZATO CON TRATTAMENTI LOCALIZZATI (ESCA) T.C.7 GG

SI RICORDA CHE È AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITÀ.



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

LE CONDIZIONI CLIMATICHE SONO MOLTO FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI: IN PREVISIONE DI POSSIBILI PERTURBAZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)

FRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 14 INTERVENTI INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ.

FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

PER INTERVENTI SUCCESSIVI ALLE PIOGGE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE ED AGGIUNGERE UN PRODOTTO RETROATTIVO A BASE DI:

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

(TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO-MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION))



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

AFIDI

IN CASO DI PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI (AFIDE LANIGERO/GRIGIO), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

SULFOXAFLOX (CLOSER) IMPIEGABILE ENTRO IL 28 GIUGNO A SEGUITO DI DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PER EMERGENZA FITOSANITARIA AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

SPIROTETRAMAT (MOVENTO) AL MASSIMO DUE INTERVENTO/ANNO

OIDIO

SULLE VARIETÀ SENSIBILI ED IN SITUAZIONI A MAGGIOR RISCHIO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ZOLFO (VARI)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

ATTENZIONE: AL FINE DI SALVAGUARDARE L'AZIONE PRONUBA DELLE API, È VIETATO L'IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI CHE IN ETICHETTA RISULTINO DANNOSI/TOSSICI PER LE API.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.