



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria






CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 02
09/04/2025

ANDAMENTO METEOROLOGICO







Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (FINE FIORITURA)

BOLLA

SI SEGNA LA PRESENZA DI SINTOMI IN CAMPO: SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ZIRAM (VARI)(MASSIMO 3 KG/HA, MAX UN INTERVENTO ALL'ANNO)

OPPURE

CAPTANO (VARI) , (MAX 3 INTERVENTI/ANNO)

MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI, SI CONSIGLIA INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH A 0,3 KG/HA)

OPPURE

CYPRODINIL (CHORUS)

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL' AVVERSITA')

***TEBUCONAZOLO (FOLICUR)**

***DIFENOCONAZOLO (DIFCOR)**

(*HANNO ANCHE AZIONE ANTI-OIDICA)

(AL MASSIMO DUE INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE TRA
TEBUCONAZOLO E DIFENOCONAZOLO)

(I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI QUATTRO VOLTE
ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

Sono vietati trattamenti in fioritura con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi.

AFIDI

A FIORITURA ULTIMATA SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A
BASE DI:

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

SPIROTETRAMAT(MOVENTO) (MASSIMO DUE TRATTAMENTI)

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO SOLO SU
AFIDE VERDE



Coldiretti Alessandria



PESCO (FINE FIORITURA)

OIDIO

SU VARIETÀ SENSIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ZOLFO (VARI)

BUPIRIMATE (NIMROD)

SUSINO-CILIEGIO (FIORITURA)

MONILIA

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE IN CASO DI PIOGGIA O BAGNATURE PERSISTENTI CON

DIFENOCONAZOLO (SCORE) o TEBUCONAZOLO (FOLICUR):
(COMPLESSIVAMENTE MASSIMO 2 INTERVENTI)

OPPURE

TRIFLOXYSTROBIN (FLINT MAX) o PYRACLOSTROBIN (MAX 2
INTERVENTI COMPLESSIVI)

FLUDIOXINIL+CYPRODINIL (SWITCH) o CYPRODINIL (CHORUS)
(MASSIMO 1 INTERVENTO)

Sono vietati trattamenti in fioritura con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi.



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO-PERO (MAZZETTI DIFFERENZIATI)

TICCHIOLATURA

IL RISCHIO INFETTIVO È ALTO PER CUI IN PREVISIONE DI PIOGGE INTERVENIRE CON

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)

MELO: FRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 14 INTERVENTI INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ.

PERO: MAX 6 INTERVENTI CON CAPTANO E 4 INTERVENTI CON DIHIANON

OIDIO

SU VARIETÀ SENSIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ZOLFO (VARI)

BUPIRIMATE (NIMROD)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.