




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria




CIA Alessandria


## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 06  
11/06/2025


### ANDAMENTO METEOROLOGICO



12 MM




36 MM




Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria



13 MM



16MM



Coldiretti Alessandria




Confagricoltura  
Alessandria



CIA Alessandria

## PESCO (ACCRESCIAMENTO FRUTTI) CYDIA MOLESTA

Montemarzino



I MODELLI PREVISIONALI E IL MONITORAGGIO IN CAMPO INDICANO CHE PROSEGUE IL VOLO DELLA SECONDA GENERAZIONE, L'OVIDEPOSIZIONE E LA NASCITA DELLE PRIME LARVE: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE PROSSIMAMENTE CON PRODOTTI AD AZIONE **OVO-**  
**LARVICIDA** A BASE DI:

**CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) T.C. 14 GG (MASSIMO 2 INT.)**  
(EFFICACE ANCHE CONTRO ANARSIA)

### OIDIO

NEI FRUTTETI A RISCHIO DI INFEZIONE E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI ANTIOIDICI SPECIFICI A BASE DI:

**ZOLFO**

**BUPIRIMATE (NIMROD) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## **PESCO** **(ACCRESIMENTO FRUTTI)**

---

### **MONILIA**

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI :

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH A 0,6 Kg/HA) T.C. 7 GG**

OPPURE

**CYPRODINIL (CHORUS) T.C. 7 GG**

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ)

**\*TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C. 7 GG**

**\*DIFENOCONAZOLO (SCORE) T.C. 7 GG**

**\*MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVISION) (AL MASSIMO DUE INTERVENTI) (\*HANNO ANCHE AZIONE ANTI-OIDICA)**

**PENTHIOPYRAD (FONTELIS) T.C. 3 GG.**

(AL MASSIMO DUE INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE TRA TEBUCONAZOLO E DIFENOCONAZOLO; I FUNGICIDI IBE MASSIMO 4 VOLTE ALL'ANNO)

---

## **ALBICOCCO** **(MATURAZIONE)**

---

### **MONILIA**

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)**

**(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)**

**FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

**TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)**  
**(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

**MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION) T.C. 3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

**PENTHIOPYRAD (FONTELIS) T.C. 3 GG.**

**(MASSIMO 1 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')**

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH) T.C. 7 GG**

OPPURE

**CYPRODINIL (CHORUS) T.C. 7 GG**

OPPURE

**(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')**



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## CILIEGIO (MATURAZIONE)

---

### MONILIA

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION) T.C.3 GG.(MASSIMO 2 INT/ANNO)**

**TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)  
(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)**

**FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

**TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)  
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH) T.C.7 GG.(MASSIMO 1 INT/ANNO)**

**PRESTARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA**

### MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

**ETOFENPROX\* (TREBON, SWORD UP) T.C. 3 GG.**

**ACETAMIPRID\* (EPIK) T.C. 14 GG \*EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA SPINOSAD* (LASER) T.C.7 GG**

**SPINOSAD (SPINTOR FLY): TALE FORMULATO VA UTILIZZATO CON TRATTAMENTI LOCALIZZATI (ESCA) T.C.7 GG**

**SI RICORDA CHE È AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITÀ.**

### *DROSOPHILA SUZUKII*

PER INTERVENTI SPECIFICI, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM OPTI) (1 INT./ANNO) T.C. 7 GG**

**DELTAMETRINA (DECIS EVO ETC) T.C. 7 GG (CON PIRETROIDI MASSIMO 2 INT./ANNO)**

**SPINETORAM (DELEGATE WDG) T.C. 7 GG IMPIEGABILE FINO AL 30/12/2025 (MASSIMO 2 INT/ANNO)**



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria




CIA Alessandria

## SUSINO (ACCRESCIAMENTO FRUTTI)

### CYDIA FUNEBRANA

Montemarzino



SIAMO NELLA FASE INIZIALE DEL VOLO DELLA SECONDA GENERAZIONE:  
IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE RISCHIO INTERVENIRE CON PRODOTTI AD  
AZIONE OVO-LARVICIDA A BASE DI:

**CLOTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INT.)**



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO-PERO (ACCRESCIAMENTO FRUTTI)

---

### TICCHIOLATURA

IN PRESENZA DI INFEZIONI IN ATTO ED IN PREVISIONE DI PRECIPITAZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

**\*FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)(MASSIMO 4 INTERVENTI)**  
**DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)**  
**DODINA (SILLYT, ETC.) (MASSIMO 2 INTERVENTI)**  
**SALI DI RAME**  
**ZOLFO**

FRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 14 INTERVENTI INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSIÀ.

*\* EFFICACE ANCHE CONTRO ALTERNARIA*

### OIDIO

SULLE VARIETÀ PIÙ RECETTIVE E NELLE AREE DI MAGGIOR RISCHIO È POSSIBILE INTERVENIRE CON

**ZOLFO (VARI)**  
**BUPIRIMATE (NIMROD) (MAX 2 INTERVENTI)**



Coldiretti Alessandria




Confagricoltura  
Alessandria



CIA Alessandria

## MELO-PERO (ACCRESCIAMENTO FRUTTI) CARPOCAPSA

Montemarzino



I DATI DEI MONITORAGGI ED I MODELLI PREVISIONALI INDICANO CHE PROSEGUE IL VOLO DEGLI ADULTI E LA FASE DI OVIDEPOSIZIONE, CON LA NASCITA DELLE PRIME LARVE: SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

**CLOTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)**



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO-PERO (ACCRESCIAMENTO FRUTTI)

---

### AFIDI

IN CASO DI PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI (AFIDE LANIGERO/GRIGIO), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO**

OPPURE

**SULFOXAFLO (CLOSER) IMPIEGABILE ENTRO IL 6 AGOSTO A SEGUITO DI DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PER EMERGENZA FITOSANITARIA**

AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO

OPPURE

**FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO**

OPPURE

**SPIROTETRAMAT (MOVENTO) IMPIEGABILE FINO AL 30/10/2025**

AL MASSIMO DUE INTERVENTO/ANNO

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**