




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria






CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA



**BOLLETTINO N° 02**  
11/03/2026

### ANDAMENTO METEOROLOGICO





Coldiretti Alessandria





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

LE CONDIZIONI DI UMIDITÀ DI QUESTI ULTIMI 15 GIORNI E LE PREVISIONI DI ULTERIORI FENOMENI PIOVOSI STANNO CREANDO LE CONDIZIONI DI RISCHIO PER LA MONILIA DELLE DRUPACEE, SOPRATTUTTO SU ALBICOCCO E PER LE VARIETÀ PRECOCI DI PESCO, PROSSIME ALLA FIORITURA.

## **PESCO** **(BOTTONI ROSA)**

---

### **BOLLA**

IN PREVISIONE DI PIOGGE O NEBBIE PERSISTENTI INTERVENIRE IMPIEGANDO

**ZIRAM(VARI)(MASSIMO 3 KG/HA, MAX UN INTERVENTO ALL'ANNO)**

*OPPURE*

**CAPTANO (VARI) , (MAX 2 INTERVENTI/ANNO)**

*OPPURE*

**DODINA (VARI) MAX 2 INTERVENTI/ANNO**

### **AFIDI/AFIDE VERDE**

NELLE ZONE A RISCHIO, PER ATTACCHI NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**TAU-FLUVALINATE (KLARTAN 20 EW, MAVRIK 20 EW, ETC.).**

**AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO**

**FLONICAMID (TEPPEKI)(MAX 2 INT/ANNO SU AFIDE VERDE)**

**ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO**

**PIRIMICARB AL MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO**

### **COCCINIGLIA**

IN SITUAZIONI A RISCHIO, INTERVENIRE CON:

**PYRIPROXIFEN (JUVINAL GOLD ETC) (AL MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO)**

**OLIO MINERALE**



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## PESCO (BOTTONI ROSA) MONILIA

---

IN PREVISIONE DI PIOGGE O NEBBIE PERSISTENTI INTERVENIRE, SOPRATTUTTO SULLE VARIETÀ PRECOCI, ENTRO LA FASE DI FIORITURA CON PRODOTTI A BASE DI :

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL** (SWITCH A 0,3 KG/HA)

OPPURE

**CYPRODINIL** (CHORUS)

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

**TEBUCONAZOLO\*** (FOLICUR) (AL MASSIMO DUE INTERVENTI)

**DIFENOCONAZOLO\*** (SCORE 25 EC) (AL MASSIMO DUE INTERVENTI)

\*AL MASSIMO 2 INTERVENTI COMPLESSIVI

(I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI TRE VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

## SUSINO (BOTTONI BIANCHI)

---

### CORINEO

INTERVENIRE IMPIEGANDO PRODOTTI A BASE DI

**ZIRAM**(VARI)(MASSIMO 3 KG/HA, MAX UN INTERVENTO ALL'ANNO)

OPPURE

**CAPTANO** (VARI) , (MAX 2 INTERVENTI/ANNO COMPLESSIVAMENTE CON ZIRAM E CAPTANO)

### AFIDE VERDE

NELLE ZONE A RISCHIO, PER ATTACCHI NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FLONICAMID** (TEPPEKI)(MAX 2 INT/ANNO)

**ACETAMIPRID** (EPIK) AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO

**PIRIMICARB** (PIRIMOR) AL MASSIMO 1 INTERVENTI/ANNO



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (ROTTURA GEMME)

---

### CANCRI RAMEALI

PREVEDERE DI ASPORTARE I RAMI COLPITI DA INFEZIONI DURANTE LA POTATURA E SUCCESSIVAMENTE INTERVENIRE CON **PRODOTTI RAMEICI** (VARI) (SI RACCOMANDA DI RISPETTARE IL QUANTITATIVO COMPLESSIVO DI 4 KG DI RAME PER ETTARO ALL'ANNO)

### TICCHIOLATURA

NONOSTANTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI, LO SVILUPPO VEGETATIVO DELLE PIANTE NON È ANCORA TALE DA ESSERE RECETTIVO PER LE INFEZIONI PRIMARIE: DAL RAGGIUNGIMENTO DELLA FASE DI PUNTE VERDI INTERVENIRE IN PREVISIONE DI PIOGGIA CON

### SALI DI RAME

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**