




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria





CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA


BOLLETTINO N° 02 11/03/2026

ANDAMENTO METEOROLOGICO







Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

LE CONDIZIONI DI UMIDITÀ DI QUESTI ULTIMI 15 GIORNI E LE PREVISIONI DI ULTERIORI FENOMENI PIOVOSI STANNO CREANDO LE CONDIZIONI DI RISCHIO PER LA MONILIA DELLE DRUPACEE, SOPRATTUTTO SU ALBICOCCO E PER LE VARIETÀ PRECOCI DI PESCO, PROSSIME ALLA FIORITURA.

PESCO **(BOTTONI ROSA)**

BOLLA

IN PREVISIONE DI PIOGGE O NEBBIE PERSISTENTI INTERVENIRE IMPIEGANDO

ZIRAM(VARI)(MASSIMO 3 KG/HA, MAX UN INTERVENTO ALL'ANNO)

OPPURE

CAPTANO (VARI) , (MAX 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

DODINA (VARI) MAX 2 INTERVENTI/ANNO

AFIDI/AFIDE VERDE

NELLE ZONE A RISCHIO, PER ATTACCHI NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

TAU-FLUVALINATE (KLARTAN 20 EW, MAVRIK 20 EW, ETC.).

AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO

FLONICAMID (TEPPEKI)(MAX 2 INT/ANNO SU AFIDE VERDE)

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO

PIRIMICARB AL MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO

COCCINIGLIA

IN SITUAZIONI A RISCHIO, INTERVENIRE CON:

PYRIPROXIFEN (JUVINAL GOLD ETC) (AL MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO)

OLIO MINERALE



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (BOTTONI ROSA) **MONILIA**

IN PREVISIONE DI PIOGGE O NEBBIE PERSISTENTI INTERVENIRE, SOPRATTUTTO SULLE VARIETÀ PRECOCI, ENTRO LA FASE DI FIORITURA CON PRODOTTI A BASE DI :

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH A 0,3 KG/HA)

OPPURE

CYPRODINIL (CHORUS)

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

TEBUCONAZOLO* (FOLICUR) (AL MASSIMO DUE INTERVENTI)

DIFENOCONAZOLO* (SCORE 25 EC) (AL MASSIMO DUE INTERVENTI)

*AL MASSIMO 2 INTERVENTI COMPLESSIVI

(I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI TRE VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

SUSINO (BOTTONI BIANCHI)

CORINEO

INTERVENIRE IMPIEGANDO PRODOTTI A BASE DI

ZIRAM(VARI)(MASSIMO 3 KG/HA, MAX UN INTERVENTO ALL'ANNO)

OPPURE

CAPTANO (VARI) , (MAX 2 INTERVENTI/ANNO COMPLESSIVAMENTE CON ZIRAM E CAPTANO)

AFIDE VERDE

NELLE ZONE A RISCHIO, PER ATTACCHI NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLONICAMID (TEPPEKI)(MAX 2 INT/ANNO)

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO

PIRIMICARB (PIRIMOR) AL MASSIMO 1 INTERVENTI/ANNO



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (ROTTURA GEMME)

CANCRI RAMEALI

PREVEDERE DI ASPORTARE I RAMI COLPITI DA INFEZIONI DURANTE LA POTATURA E SUCCESSIVAMENTE INTERVENIRE CON **PRODOTTI RAMEICI** (VARI) (SI RACCOMANDA DI RISPETTARE IL QUANTITATIVO COMPLESSIVO DI 4 KG DI RAME PER ETTARO ALL'ANNO)

TICCHIOLATURA

NONOSTANTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI, LO SVILUPPO VEGETATIVO DELLE PIANTE NON È ANCORA TALE DA ESSERE RECETTIVO PER LE INFEZIONI PRIMARIE: DAL RAGGIUNGIMENTO DELLA FASE DI PUNTE VERDI INTERVENIRE IN PREVISIONE DI PIOGGIA CON

**SALI DI RAME
METIRAM.**

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.