



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria





CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 03
09/04/2026

ANDAMENTO METEOROLOGICO







Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

LA VARIABILITÀ CLIMATICA (RISCHIO DI GELATE) IN CONCOMITANZA CON GLI ANTICIPI VEGETATIVI IN ALCUNI CASI HANNO MESSO A RISCHIO LA PRODUZIONE FRUTTICOLA: ATTUALMENTE LE TEMPERATURE SONO IN RIALZO E LE CONDIZIONI DI UMIDITÀ SONO BASSE.

PESCO (CADUTA PETALI-ALLEGAGIONE)

BOLLA

IN PREVISIONE DI PIOGGE O CONDIZIONI DI ELEVATA UMIDITÀ INTERVENIRE IMPIEGANDO

ZIRAM(VARI)(MASSIMO 3 KG/HA, MAX UN INTERVENTO ALL'ANNO)

OPPURE

CAPTANO (VARI) , (MAX 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

DODINA (VARI) MAX 2 INTERVENTI/ANNO

MONILIA

IN CASO DI PIOGGIA E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH A 0,3 KG/HA)

OPPURE

CYPRODINIL (CHORUS)

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSAITÀ)

***TEBUCONAZOLO (FOLICUR)**

***DIFENOCONAZOLO (DIFCOR)**

***MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVISION)** (AL MASSIMO DUE INTERVENTI) (*HANNO ANCHE AZIONE ANTI-OIDICA E CONTRO CANCRI RAMEALI)

(AL MASSIMO DUE INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE TRA TEBUCONAZOLO E DIFENOCONAZOLO)

(I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI QUATTRO VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSAITÀ)



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (CADUTA PETALI-ALLEGAGIONE)

AFIDI

A FIORITURA ULTIMATA SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

TAU-FLUVALINATE (KLARTAN 20 EW, MAVRIK 20 EW, ETC..).

AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO

FLONICAMID (TEPPEKI)(MAX 2 INT/ANNO SU AFIDE VERDE)

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO

PIRIMICARB AL MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO

***SULFOXAFLO**R (CLOSER)(1 INT/ANNO)

***SPIROTETRAMAT**(MOVENTO) (1 INT/ANNO)

* **PRODOTTI IMPIAGABILI A SEGUITO DI DEROGA TERRITORIALE PER USI ECCEZIONALI**

OIDIO

SU VARIETÀ SENSIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ZOLFO (VARI)

BUPIRIMATE (NIMROD)

SUSINO-CILIEGIO (FIORITURA)

MONILIA

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE IN CASO DI PIOGGIA O BAGNATURE PERSISTENTI CON

DIFENOCONAZOLO (SCORE) o **TEBUCONAZOLO** (FOLICUR):
(COMPLESSIVAMENTE MASSIMO 2 INTERVENTI)

OPPURE

TRIFLOXYSTROBIN (FLINT MAX) o **PYRACLOSTROBIN** (MAX 2 INTERVENTI COMPLESSIVI)

FLUDIOXINIL+CYPRODINIL (SWITCH) o **CYPRODINIL** (CHORUS)
(MASSIMO 1 INTERVENTO)

Sono vietati trattamenti in fioritura con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi.



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INIZIO FIORITURA)

TICCHIOLATURA

LO SVILUPPO VEGETATIVO È SUSCETTIBILE A POSSIBILI INFEZIONI PRIMARIE: IN PREVISIONE DI PIOGGE, INTERVENIRE CON SALI DI RAME
ZOLFO
FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)
DITHIANON (FRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 18 INTERVENTI INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ).

Sono vietati trattamenti in fioritura con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.