



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria





CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA


**BOLLETTINO N° 04**  
28/04/2026

### ANDAMENTO METEOROLOGICO







Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria



CIA Alessandria





Coldiretti Alessandria




Confagricoltura  
Alessandria



CIA Alessandria

## PESCO (ACCRESCIAMENTO FRUTTI) CYDIA MOLESTA

Montemarzino



I MODELLI PREVISIONALI REGIONALI INDICANO CHE SIAMO NELLA FASE INIZIALE DELLA I GENERAZIONE CON PRESENZA AVANZATA DI ADULTI E CONSEGUENTE AVANZAMENTO DELLA FASE LARVALE.

**IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE RISCHIO** E' POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 14 GG**

**ETOFENPROX (TREBON-SWORD UP)(MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG**

**SPINOSAD (LASER) (MASSIMO 3 INTERVENTI CON SPINOSINE)T.C. 7GG.**



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## PESCO (ACCRESCIAMENTO FRUTTI)

---

### BOLLA

IN PREVISIONE DI PIOGGE SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**DODINA (VARI) (MAX 2 INTERVENTI/ANNO)**

*OPPURE*

**CAPTANO (VARI) , (MAX 4 INTERVENTI/ANNO TRA ZIRAM E CAPTANO)**

IN SITUAZIONI DI PRESENZA DI SINTOMI IN CAMPO, LOCALIZZATI SOPRATTUTTO SUI GERMOGLI APICALI, INTERVENIRE CON **POLISOLFURO DI CALCIO**.

### AFIDI

INTERVENIRE, AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 10% DI GERMOGLI OCCUPATI CON PRODOTTI A BASE DI:

**TAU-FLUVALINATE (KLARTAN 20 EW, MAVRIK 20 EW, ETC..).**

AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO

**FLONICAMID (TEPPEKI)(MAX 2 INT/ANNO SU AFIDE VERDE)**

**ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO**

**PIRIMICARB AL MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO**

**\*SULFOXAFLOL (CLOSER)(1 INT/ANNO)**

**\*SPIROTETRAMAT(MOVENTO) (1 INT/ANNO)**

**\* PRODOTTI IMPIAGABILI A SEGUITO DI DEROGA TERRITORIALE PER USI ECCEZIONALI**

### OIDIO

SU VARIETÀ SENSIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**ZOLFO (VARI)**

**BUPIRIMATE (NIMROD)**



Coldiretti Alessandria



## ALBICOCCO (ACRESCIMENTO FRUTTI)

### OIDIO

SU VARIETÀ SENSIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:


**ZOLFO (VARI)**

**BUPIRIMATE (NIMROD)**

## SUSINO (ACCRESIMENTO FRUTTI)

### CYDIA FUNEBRANA

Montemarzino



I MODELLI PREVISIONALI REGIONALI SEGNALANO PRESENZA DI LARVE E ADULTI: SIAMO NELLA FASE INIZIALE DELLA I GENERAZIONE, CON PRESENZA IN CRESCITA DI ADULTI ED INIZIO DELLA FASE DI OVIDEPOSIZIONE.

**IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE RISCHIO** E' POSSIBILE INTERVENIRE **DALLA PROSSIMA SETTIMANA** CON PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

**CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INT.)**



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO

(ALLEGAGIONE-ACCRESIMENTO FRUTTI)

---

### TICCHIOLATURA

LA FASE FENOLOGICA ATTUALE È DI ELEVATA SENSIBILITÀ ED È NECESSARIO MANTENERE ADEGUATA PROTEZIONE DA POSSIBILI INFEZIONI: IN PREVISIONE DI POSSIBILI PERTURBAZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FLUAZINAM** (NANDO MAXI, ETC..)

**DITHIANON** (DELAN 70WG, ETC.)

FRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 18 INTERVENTI INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ.

**FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO** (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)

**PENTHIOPYRAD** (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

PER INTERVENTI SUCCESSIVI ALLE PIOGGE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE ED AGGIUNGERE UN PRODOTTO RETROATTIVO A BASE DI:

**IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)**

(TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, TETRACONAZOLO-MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION))



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## CILIEGIO (ACCRESCIAMENTO FRUTTI) AFIDE NERO

---

IN PRESENZA DELL'AFIDE ED AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 3% DI ORGANI INFESTATI, INTERVENIRE CON  
**FLONICAMID (TEPPEKI) (MAX 2)**  
**FLUPYRADIFURONE (SIVANTO) (MAX 1)**  
\***SULFOXAFLOR (CLOSER)**  
\***SPIROTETRAMAT(MOVENTO)**  
\* **PRODOTTI IMPIAGABILI A SEGUITO DI DEROGA TERRITORIALE PER USI ECCEZIONALI**

**Sono vietati trattamenti in fioritura con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi.**

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**