




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria





CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA


**BOLLETTINO N° 05**  
19/05/2026

### ANDAMENTO METEOROLOGICO







Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria




CIA Alessandria





Coldiretti Alessandria




Confagricoltura  
Alessandria



CIA Alessandria

## PESCO (ACCRESIMENTO FRUTTI) CYDIA MOLESTA

Montemarzino



I MODELLI PREVISIONALI E IL MONITORAGGIO IN CAMPO INDICANO CHE IL CICLO BIOLOGICO DELL'INSETTO PROCEDE LENTAMENTE: LA FASE LARVALE È IN CRESCITA PER CUI, IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE RISCHIO, È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 14 GG**  
**ETOFENPROX (TREBON-SWORD UP)(MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG**  
**SPINOSAD (LASER) (MASSIMO 3 INTERVENTI CON SPINOSINE)T.C. 7GG.**



Coldiretti Alessandria



## **PESCO** (ACCRESIMENTO FRUTTI)

---

### **OIDIO**

NEI FRUTTETI A RISCHIO DI INFEZIONE E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI ANTIROIDICI SPECIFICI A BASE DI:

**ZOLFO**

**BUPIRIMATE (NIMROD) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

### **AFIDI**

INTERVENIRE, AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 10% DI GERMOGLI OCCUPATI CON PRODOTTI A BASE DI:

**TAU-FLUVALINATE (KLARTAN 20 EW, MAVRIK 20 EW, ETC..).**

**AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO**

**FLONICAMID (TEPPEKI)(MAX 2 INT/ANNO SU AFIDE VERDE)**

**ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO**

**PIRIMICARB AL MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO**

**\*SULFOXAFLO (CLOSER)(1 INT/ANNO)**

**\*SPIROTE TRAMAT(MOVENTO) (1 INT/ANNO)**

**\* PRODOTTI IMPIAGABILI A SEGUITO DI DEROGA TERRITORIALE PER USI ECCEZIONALI**

## **ALBICOCCO** (ACRESIMENTO FRUTTI)

---

### **OIDIO**

SU VARIETÀ SENSIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**ZOLFO (VARI)**

**BUPIRIMATE (NIMROD)**



Coldiretti Alessandria



## CILIEGIO (INVAIATURA-MATURAZIONE)

### MONILIA

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION) T.C.3 GG.(MASSIMO 2 INT/ANNO)**

**TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)  
(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)**

**FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

**TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)  
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH) T.C.7 GG.(MASSIMO 1 INT/ANNO)**

**PRESTARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA**

### MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

**ETOFENPROX\* (TREBON, SWORD UP) T.C. 3 GG.**

**ACETAMIPRID\* (EPIK) T.C. 14 GG \*EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA SPINOSAD* (LASER) T.C.7 GG**

**SPINOSAD (SPINTOR FLY): TALE FORMULATO VA UTILIZZATO CON TRATTAMENTI LOCALIZZATI (ESCA) T.C.7 GG**

SI RICORDA CHE È AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITÀ.

### *DROSOPHILA SUZUKII*

PER INTERVENTI SPECIFICI, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:


**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM OPTI) (1 INT./ANNO) T.C. 7 GG**

**DELTAMETRINA (DECIS EVO ETC) T.C. 7 GG (CON PIRETROIDI MASSIMO 2 INT./ANNO)**

**SPINETORAM (DELEGATE WDG) T.C. 7 GG IMPIEGABILE PER DEROGA USI D'EMERGENZA FINO AL 28/07/2026**



Coldiretti Alessandria




Confagricoltura  
Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (ACCRESIMENTO FRUTTI)

### CARPOCAPSA



IL MODELLO PREVISIONALE INDICA CHE È INIZIATA LA FASE DI OVIDEPOSIZIONE DELLA PRIMA GENERAZIONE. SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE NEI PROSSIMI GIORNI CON PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA A BASE DI:

**CLOTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INT.)**



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO-PERO (ACCRESIMENTO FRUTTI)

---

### TICCHIOLATURA

LE CONDIZIONI CLIMATICHE SONO MOLTO FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI: MONITORARE ATTENTAMENTE IL FRUTTETO PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI INFEZIONI.

IN ASSENZA DI INFEZIONI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)**

**DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)**

FRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 14 INTERVENTI INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ.

**FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE)** (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)

**PENTHIOPYRAD (FONTELIS)** (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

PER INTERVENTI SUCCESSIVI ALLE PIOGGE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE ED AGGIUNGERE UN PRODOTTO RETROATTIVO A BASE DI:

**IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)**

(TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, TETRACONAZOLO-MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION))

### OIDIO

SULLE VARIETÀ PIÙ RECETTIVE E NELLE AREE DI MAGGIOR RISCHIO È POSSIBILE INTERVENIRE CON


**ZOLFO (VARI)**

**BUPIRIMATE (NIMROD)** (MAX 2 INTERVENTI)

EVENTUALI SDHI (FLUXAPYROXAD, FLUOPYRAM E PENTHIOPYRAD) E IBE (MEFENTRIFLUCONAZOLO E DIFENOCONAZOLO) IMPIEGATI PER IL CONTROLLO DI TICCHIOLATURA SONO ATTIVI ANCHE NEI CONFRONTI DI QUESTA AVVERSITÀ.



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria




CIA Alessandria

## SUSINO (ACCRESCIAMENTO FRUTTI)

### CYDIA FUNEBRANA

Montemarzino



I MODELLI PREVISIONALI REGIONALI SEGNALANO LA FINE DELLA FASE LARVALE: SI CONSIGLIA DI ATTENDERE LE INDICAZIONI DEI PROSSIMI BOLLETTINI

**Sono vietati trattamenti in fioritura con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi.**

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando**



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

**della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**