




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria





CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA


BOLLETTINO N° 06
05/06/2026

ANDAMENTO METEOROLOGICO







Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria




CIA Alessandria

PESCO (ACCRESCIAMENTO FRUTTI) CYDIA MOLESTA

I MODELLI PREVISIONALI INDICANO CHE È INIZIATO IL VOLO DELLA SECONDA GENERAZIONE CON LA FASE DI OVIDEPOSIZIONE E LA NASCITA DELLE PRIME LARVE: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE PROSSIMAMENTE CON PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

CLOTRANILIPROLE (CORAGEN) T.C. 14 GG (MASSIMO 2 INT.)
(EFFICACE ANCHE CONTRO ANARSIA)

Montemarzino



OIDIO

NEI FRUTTETI A RISCHIO DI INFEZIONE E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI ANTOIDICI SPECIFICI A BASE DI:

ZOLFO

BUPIRIMATE (NIMROD) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (ACCRESCIAMENTO FRUTTI) MONILIA

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI :

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH A 0,6 Kg/HA) T.C. 7 GG

OPPURE

CYPRODINIL (CHORUS) T.C. 7 GG

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ)

***TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C. 7 GG**

***DIFENOCONAZOLO (SCORE) T.C. 7 GG**

***MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVISION) (AL MASSIMO DUE INTERVENTI) (*HANNO ANCHE AZIONE ANTI-OIDICA)**

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (AL MASSIMO 1 INTERVENTO) T.C. 3 GG.

(AL MASSIMO DUE INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE TRA TEBUCONAZOLO E DIFENOCONAZOLO; I FUNGICIDI IBE MASSIMO 4 VOLTE ALL'ANNO)

ALBICOCCO (MATURAZIONE)

MONILIA

PER LE VARIETÀ SENSIBILI E PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)

(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION) T.C. 3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

PENTHIOPYRAD (FONTELIS)(AL MASSIMO 1 INTERVENTO) T.C. 3 GG.

(MASSIMO 1 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH) T.C. 7 GG

OPPURE

CYPRODINIL (CHORUS) T.C. 7 GG

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO (MATURAZIONE)

MONILIA

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION) T.C.3 GG.(MASSIMO 2 INT./ANNO)

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT./ANNO)
(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH) T.C.7 GG.(MASSIMO 1 INT./ANNO)

PRESTARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA

MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

ETOFENPROX* (TREBON, SWORD UP) T.C. 3 GG.

ACETAMIPRID* (EPIK) T.C. 14 GG *EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA SPINOSAD* (LASER) T.C.7 GG

SPINOSAD (SPINTOR FLY): TALE FORMULATO VA UTILIZZATO CON TRATTAMENTI LOCALIZZATI (ESCA) T.C.7 GG

SI RICORDA CHE È AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITÀ.

DROSOPHILA SUZUKII

PER INTERVENTI SPECIFICI, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM OPTI) (1 INT./ANNO) T.C. 7 GG

DELTAMETRINA (DECIS EVO ETC) T.C. 7 GG (CON PIRETROIDI MASSIMO 2 INT./ANNO)

SPINETORAM (DELEGATE WDG) T.C. 7 GG IMPIEGABILE PER DEROGA USI D'EMERGENZA FINO AL 28/07/2026



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria




CIA Alessandria

MELO (ACCRESCIAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

Montemarzino



IL MODELLO PREVISIONALE INDICA CHE PROSEGUE LA FASE LARVALE DELLA PRIMA GENERAZIONE.

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE NEI PROSSIMI GIORNI CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO-PERO (ACCRESIMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

SI CONSIGLIA DI MONITORARE ATTENTAMENTE IL FRUTTETO PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI INFEZIONI.

IN ASSENZA DI INFEZIONI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)

FRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 14 INTERVENTI INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ.

FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

PER INTERVENTI SUCCESSIVI ALLE PIOGGE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE ED AGGIUNGERE UN PRODOTTO RETROATTIVO A BASE DI:

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

(TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, TETRACONAZOLO-
MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION))

OIDIO

SULLE VARIETÀ PIÙ RECETTIVE E NELLE AREE DI MAGGIOR RISCHIO È POSSIBILE INTERVENIRE CON

ZOLFO (VARI)

BUPIRIMATE (NIMROD) (MAX 2 INTERVENTI)

EVENTUALI SDHI (FLUXAPYROXAD, FLUOPYRAM E PENTHIOPYRAD) E IBE (MEFENTRIFLUCONAZOLO E DIFENOCONAZOLO) IMPIEGATI PER IL CONTROLLO DI TICCHIOLATURA SONO ATTIVI ANCHE NEI CONFRONTI DI QUESTA AVVERSITÀ.



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria




CIA Alessandria

SUSINO (ACCRESCIAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

Montemarzino



I MODELLI PREVISIONALI REGIONALI SEGNALANO ANCORA LA FINE DELLA FASE LARVALE E LA COMPARSA DEI PRIMI ADULTI: SI CONSIGLIA DI ATTENDERE LE INDICAZIONI DEI PROSSIMI BOLLETTINI

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.