



Coldiretti Alessandria





CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

### BOLLETTINO N° 07 17/06/2026

#### ANDAMENTO METEOROLOGICO







Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria



CIA Alessandria






Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## PESCO (ACCRESIMENTO FRUTTI/MATURAZIONE) CYDIA MOLESTA



I MODELLI PREVISIONALI ED I DATI DI CAMPO INDICANO L'AVANZAMENTO DELLA FASE LARVALE DI II GENERAZIONE: SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 14 GG**

**ETOFENPROX (TREBON)(MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG**

**SPINOSAD (LASER) (MASSIMO 3 INTERVENTI CON SPINOSINE)T.C. 7GG.**



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## PESCO

(ACCRESIMENTO FRUTTI/MATURAZIONE)

### MONILIA

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI :

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL** (SWITCH A 0,6 Kg/HA) T.C. 7 GG

OPPURE

**CYPRODINIL** (CHORUS) T.C. 7 GG

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ)

\***TEBUCONAZOLO** (FOLICUR) T.C. 7 GG

\***DIFENOCONAZOLO** (SCORE) T.C. 7 GG

\***MEFENTRIFLUCONAZOLO** (REVISION) (AL MASSIMO DUE INTERVENTI) (\*HANNO ANCHE AZIONE ANTI-OIDICA)

**PENTHIOPYRAD** (FONTELIS) (AL MASSIMO 1 INTERVENTO) T.C. 3 GG.

(AL MASSIMO DUE INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE TRA TEBUCONAZOLO E DIFENOCONAZOLO; I FUNGICIDI IBE MASSIMO 4 VOLTE ALL'ANNO)

### OIDIO

NEI FRUTTETI A RISCHIO DI INFEZIONE E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI ANTIOIDICI SPECIFICI A BASE DI:

**ZOLFO**

**BUPIRIMATE** (NIMROD) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## **ALBICOCCO** (MATURAZIONE)

---

### **MONILIA**

PER LE VARIETÀ SENSIBILI E PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**TEBUCONAZOLO (FOLICUR)** T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)  
(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)

**FENEXAMIDE (TELDOR)** T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

**TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO** T.C. 7 GG. (FLINT MAX)  
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

**MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION)** T.C. 3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

**PENTHIOPYRAD (FONTELIS)**(AL MASSIMO 1 INTERVENTO) T.C. 3 GG.  
(MASSIMO 1 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)** T.C. 7 GG

OPPURE

**CYPRODINIL (CHORUS)** T.C. 7 GG

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

## **CILIEGIO** (MATURAZIONE)

---

### **MONILIA**

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION)** T.C.3 GG.(MASSIMO 2 INT/ANNO)

**TEBUCONAZOLO (FOLICUR)** T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)  
(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)

**FENEXAMIDE (TELDOR)** T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

**TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO** T.C. 7 GG. (FLINT MAX)  
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)** T.C.7 GG.(MASSIMO 1 INT/ANNO)

**PRESTARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA**



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## CILIEGIO (MATURAZIONE)

---

### MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

**ETOFENPROX\*** (TREBON, SWORD UP) T.C. 3 GG.

**ACETAMIPRID\*** (EPIK) T.C. 14 GG \*EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA*  
**SPINOSAD** (LASER) T.C. 7 GG

**SPINOSAD** (SPINTOR FLY): TALE FORMULATO VA UTILIZZATO CON TRATTAMENTI LOCALIZZATI (ESCA) T.C. 7 GG

SI RICORDA CHE È AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITÀ.

### ***DROSOPHILA SUZUKII***

PER INTERVENTI SPECIFICI, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**EMAMECTINA BENZOATO** (AFFIRM OPTI) (1 INT./ANNO) T.C. 7 GG

**DELTAMETRINA** (DECIS EVO ETC) T.C. 7 GG (CON PIRETROIDI MASSIMO 2 INT./ANNO)

**SPINETORAM** (DELEGATE WDG) T.C. 7 GG **IMPIEGABILE PER DEROGA USI D'EMERGENZA FINO AL 28/07/2026**




Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (ACCRESIMENTO FRUTTI)



### CARPOCAPSA

IL MODELLO PREVISIONALE ED I RILIEVI DI CAMPO INDICANO CHE SI STA ANDANDO VERSO LA FINE DELLA FASE LARVALE DI I GENERAZIONE: SOLAMENTE IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA , ALTRIMENTI ASPETTARE LE INDICAZIONI DEI PROSSIMI BOLLETTINI



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO-PERO (ACCRESIMENTO FRUTTI)

---

### TICCHIALATURA

SI CONSIGLIA DI MONITORARE LA SITUAZIONE PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI INFEZIONI: INTERVENIRE IN CASO DI PRECIPITAZIONI LADDOVE SIANO PRESENTI MACCHIE.

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE, IN ASSENZA DI INFEZIONI AL MOMENTO NON SI CONSIGLIANO INTERVENTI SPECIFICI.

### OIDIO

SULLE VARIETÀ PIÙ RECETTIVE E NELLE AREE DI MAGGIOR RISCHIO È POSSIBILE INTERVENIRE CON

**ZOLFO (VARI)**

**BUPIRIMATE (NIMROD) (MAX 2 INTERVENTI)**

EVENTUALI SDHI (FLUXAPYROXAD, FLUOPYRAM E PENTHIOPYRAD) E IBE (MEFENTRIFLUCONAZOLO E DIFENOCONAZOLO) IMPIEGATI PER IL CONTROLLO DI TICCHIALATURA SONO ATTIVI ANCHE NEI CONFRONTI DI QUESTA AVVERSITÀ.




Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## SUSINO (ACCRESIMENTO FRUTTI)

### CYDIA FUNEBRANA



I MODELLI PREVISIONALI REGIONALI SEGNALANO L'INIZIO DELL'OVIDEPOSIZIONE DI II GEN E LE PRIMISSIME LARVE: IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE RISCHIO È POSSIBILE INTERVENIRE **DALLA PROSSIMA SETTIMANA** CON PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

**CLOTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INT.)**

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.