



Coldiretti Alessandria





CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 08
01/07/2026

ANDAMENTO METEOROLOGICO







Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria






Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (ACCRESIMENTO FRUTTI/MATURAZIONE) CYDIA MOLESTA



I MODELLI PREVISIONALI ED I DATI DI CAMPO INDICANO IL PASSAGGIO ALLA III GENERAZIONE: IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI OPPURE AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI 10 CATTURE/TRAPPOLA A SETTIMANA, INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 14 GG

ETOFENPROX (TREBON)(MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG

SPINOSAD (LASER 120 SC) (MASSIMO 3 INTERVENTI CON SPINOSINE)T.C. 7GG.



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO **(ACCRESIMENTO FRUTTI/MATURAZIONE)**

MONILIA

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI :

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH A 0,6 Kg/HA) T.C. 7 GG

OPPURE

CYPRODINIL (CHORUS) T.C. 7 GG

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ)

***TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C. 7 GG**

***DIFENOCONAZOLO (SCORE) T.C. 7 GG**

***MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVISION) (AL MASSIMO DUE INTERVENTI) (*HANNO ANCHE AZIONE ANTI-OIDICA)**

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (AL MASSIMO 1 INTERVENTO) T.C. 3 GG.

(AL MASSIMO DUE INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE TRA TEBUCONAZOLO E DIFENOCONAZOLO; I FUNGICIDI IBE MASSIMO 4 VOLTE ALL'ANNO)

OIDIO

NEI FRUTTETI A RISCHIO DI INFEZIONE E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI ANTIOIDICI SPECIFICI A BASE DI:

ZOLFO

BUPIRIMATE (NIMROD) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)




Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (ACCRESIMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA



IL MODELLO PREVISIONALE ED I RILIEVI DI CAMPO INDICANO CHE STA RIPRENDENDO IL VOLO DEGLI ADULTI, A BREVE INIZIERÀ L'OVIDEPOSIZIONE: DALLA PROSSIMA SETTIMANA INTERVENIRE CON PRODOTTI **AZIONE OVO-LARVICIDA**, A BASE DI:

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INT.)

IN ALTERNATIVA, VERSO LA FINE DELLA PROSSIMA SETTIMANA, INTERVENIRE CON PRODOTTI AD **AZIONE LARVICIDA**.



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO-PERO **(ACCRESIMENTO FRUTTI)**

TICCHIOLATURA

IN CASO DI PRESENZA DI SINTOMI, IN PREVISIONE DI PIOGGE O ELEVATA UMIDITÀ, INTERVENIRE UTILIZZANDO PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI

BICARBONATO DI POTASSIO/SALI DI RAME
ZOLFO

OIDIO

SULLE VARIETÀ PIÙ RECETTIVE E NELLE AREE DI MAGGIOR RISCHIO È POSSIBILE INTERVENIRE CON

ZOLFO (VARI)

BUPIRIMATE (NIMROD) (MAX 2 INTERVENTI)




Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

SUSINO (ACCRESIMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA



I MODELLI PREVISIONALI REGIONALI SEGNALANO L'AVANZAMENTO DELLA FASE LARVALE: AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA INDICATIVA DI 10 CATTURE PER TRAPPOLA A SETTIMANA È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.
SPINOSAD (LASER 120 SC) (MAX 3 INT./ANNO) T.C. 7 GG.
ACETAMIPRID (KESTREL) (DUE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.